



## Analerkrankungen

## Liebe Patientin, lieber Patient,

in unserer Spezialbroschüre „Analerkrankungen“ finden Sie umfassende Informationen zu diesem Thema.


Wir bieten Ihnen eine individuelle Diagnose und eine sanfte, nachhaltige Therapie auf dem neuesten Stand der Chirurgie an.

Ihre



Dr. med. Marion Hall

Chirurgin – Gefäßchirurgie – Phlebologie - Proktologie



Dr. med. Karin Braun-Kroher

Chirurgin – Phlebologie – Proktologie

## Abszesse und Fisteln

### Was sind Abszesse und Fisteln?

Ein Analabszess ist eine eitrige Entzündung im Bereich des Schließmuskels, manchmal am Analand, manchmal eher im Analkanal liegend.

### Wie entstehen Abszesse und Fisteln?

Ursache für die Eiterbildung ist häufig eine Fistel, d.h. ein Verbindungsgang zwischen dem Darminnen und der äußeren Haut, durch den Darmbakterien ins Gewebe gelangen und dort eine eitrige Entzündung auslösen.

### Was sind die Symptome?

Ein Analabszess äußert sich durch innerhalb von Stunden oder Tagen rasch zunehmende, starke Schmerzen am After. Manchmal spürt man auch eine heiße, schmerzhafte Vorwölbung, die v.a. beim Stuhlgang und der darauffolgenden Säuberung des Afterns sehr unangenehm ist.

### Unsere Behandlungsmethode

Um ein Abfließen des Eiters und somit eine sofortige Besserung der Schmerzen zu erreichen, wird der Abszess meist in lokaler Betäubung eröffnet. Zusätzlich ist je nach Größe der Abszesshöhle und dem allgemeinen Krankheitsgefühl eine Antibiotikaeinnahme nötig. Bei sehr ausgedehnten Befunden kann nur in Narkose operiert werden.

Falls eine Fistel als Ursache des Abszesses gefunden wird, muss diese nach Abheilen der akuten Entzündung gesondert behandelt werden. Die Art und das Ausmaß des operativen Eingriffs ist je nach Fistelverlauf sehr unterschiedlich und muss im Einzelfall genau erörtert werden.

## Polypen

### Was sind Polypen?

Wucherungen der Haut oder Schleimhaut werden zusammenfassend als Polypen bezeichnet. Sie können ganz harmlos sein, aber auch Vorstufen einer bösartigen Erkrankung darstellen. Deshalb sollte jede, an Größe zunehmende Wucherung am After abgeklärt werden.

### Unsere Behandlungsmethode

Wenn ein Polyp am Analrand sitzt, kann er in örtlicher Betäubung abgetragen werden. Wucherungen der Darmschleimhaut, die nicht von außen zu sehen oder zu tasten sind, müssen in Narkose entfernt werden.

## Feigwarzen

### Was sind Feigwarzen?

Feigwarzen sind Wucherungen der Haut, die durch eine Infektion mit dem Papillomvirus ausgelöst werden.

### Wie entstehen Feigwarzen?

Feigwarzen können im Analbereich, aber auch im Genitalbereich auftreten und sind ansteckend, d.h. die Viren können durch Körperkontakt - meist beim Geschlechtsverkehr - übertragen werden

### Was ist das Symptom?

Das vorwiegende Symptom der Feigwarzen am After ist Juckreiz, manchmal auch Blutungen. Man tastet kleine, um den After angesiedelte Wucherungen oder auch wenige größere Warzen.

### **Unsere Behandlungsmethoden**

Feigwarzen können durch Tinktur, Salbe oder Operation entfernt werden. Oft bewährt sich eine Kombination aus Operation und Salbennachbehandlung. Feigwarzen neigen – ähnlich wie der Lippenherpes - zum Wiederkommen. Daher sollte nach der Erstmanifestation für einige Zeit regelmäßig nachuntersucht werden.

### **Afterriss**

#### **Was ist ein Afterriss?**

Ein Afterriss oder Analfissur ist ein Einriss der Haut im Afterkanal, am häufigsten in Richtung des Steißbeines lokalisiert. Ein Einriss kann aber prinzipiell an jeder Stelle des Afters vorkommen.

#### **Wie entsteht ein Afterriss?**

Er entsteht bei der Stuhlentleerung, v.a. wenn der Stuhlgang hart ist und heftiges Pressen nötig macht.

#### **Was sind die Symptome?**

Da die Anahaut hochsensibel ist, äußert sich der Riss durch heftige Schmerzen und Blutung, die Schmerzen halten oft für Stunden nach der Entleerung noch an. Es entsteht ein Teufelskreis aus Schmerz und Angst vor dem nächsten Toilettengang, wodurch sich der Schließmuskel immer mehr verkrampft und die Entleerung erschwert. Häufig tragen auch psychische Stresssituationen zur Entstehung des Afterrisses bei oder verhindern eine schnelle Abheilung.

### **Unsere Behandlungsmethoden**

Die Behandlung eines Afterrisses ist fast immer langwierig und erfordert Geduld vonseiten des Patienten und des behandelnden Arztes. Auch wenn der Riss abgeheilt ist, kann eine Verstopfung jederzeit zu einer erneuten Verletzung der Analhaut führen.

Häufig gelingt die Heilung allein mit Salben, eventuell unterstützend mit mechanischer Dehnung des Schließmuskels. In hartnäckigen und chronischen Fällen kann auch eine Operation zum Erfolg führen. Auch die Injektion von Botulinumtoxin (bekannt aus der kosmetischen Faltenbehandlung im Gesicht) in den Schließmuskel hat sich in unserer Praxis sehr bewährt.

## **Analvenenthrombose**

### **Was ist eine Analvenenthrombose?**

Als Analvenenthrombose bezeichnet man eine verhärtete (thrombosierte) Vene am Anus.

### **Wie entsteht eine Analvenenthrombose?**

Diese entsteht meist ohne ersichtlichen Grund und innerhalb von Stunden am After als tastbarer schmerzhafter Knoten unterschiedlicher Größe.

### **Was sind die Symptome?**

Vor allem beim Sitzen, während der Stuhlentleerung und bei der Analhygiene verursacht der Knoten Beschwerden.

### **Unsere Behandlungsmethoden**

Wenn der Knoten sehr klein ist, kann eine Behandlung mit Salbe aus-

reichend sein und der Knoten bildet sich innerhalb von 1 - 2 Wochen wieder zurück. Bei großen und sehr schmerzhaften Knoten sollte die Entleerung des geronnenen Blutes in örtlicher Betäubung durchgeführt werden.

## Marisken

### Was sind Marisken?

Marisken sind häufig vorkommende hautfarbene Knoten am äußeren Analrand, die einzeln aber auch zu mehreren den After kranzförmig umrahmen können.

Sie finden sich in jedem Lebensalter. Ihr Namen ist auf die vom äußeren Aspekt gegebene Ähnlichkeit mit Feigen zurückzuführen (französisch. Marisque).

### Unsere Behandlungsmethoden

Eine besondere Therapie ist, abgesehen von einer sorgfältigen Analhygiene, nicht nötig. Falls sich entzündliche Reaktionen oder kleine Rhagaden auf der Oberfläche der Marisken zeigen, empfehlen sich Salben oder Pasten zur Pflege.

Derbe und stark störende Knoten können chirurgisch entfernt werden, wobei aber mit einer relativ langwierigen und schmerzhaften Wundheilung gerechnet werden muss.

### Kosten

Wir beraten Sie umfassend über die medizinischen Aspekte und Kosten der oben aufgeführten Behandlungen.

# Chirurgische Gemeinschaftspraxis

**Dr. med. Karin Braun-Kroher**

Chirurgin • Phlebologie • Proktologie

**Dr. med. Marion Hall**

Chirurgin • Gefäßchirurgie  
Phlebologie • Proktologie

Barer Straße 60  
80799 München

Telefon: 0 89 / 28 60 50  
Fax: 0 89 / 28 46 37  
eMail: [info@dres-braun-hall.de](mailto:info@dres-braun-hall.de)

Weitere Informationen finden Sie  
im Internet unter:  
[www.dres-braun-hall.de](http://www.dres-braun-hall.de)

